

比较采用 χ^2 检验。均用 SPSS8.0 软件统计处理。

2 结果

2.1 疗效比较 两组治疗 6 周后治疗组治愈 5 例,有效 12 例,无效 7 例,有效率为 70.8%;对照组有效 5 例,无效 19 例,有效率为 20.8%。两组比较差异有统计学意义($\chi^2=4.851, P<0.01$)。

2.2 HAMD 评分比较 治疗组在 2 周后 HAMD 评分开始降低($t\leq 3.106, P<0.05$),症状改善;治疗第 4、6 周后与对照组比较差异均有统计学意义($t\geq 4.522, P<0.01$),症状也较对照组明显改善。见表 1。

2.3 不良反应 治疗组有 2 例出现一过性胃肠不适,但未中断治疗。

表 1 两组治疗前后 HAMD 评分变化(分, $\bar{x}\pm s$)

组别	例数	治疗前	治疗 2 周	治疗 4 周	治疗 6 周
治疗组	24	19.12 $\pm$ 3.68	15.20 $\pm$ 4.24 ^a	10.88 $\pm$ 1.20 ^{ab}	5.80 $\pm$ 1.66 ^{ab}
对照组	24	19.16 $\pm$ 3.46	16.12 $\pm$ 4.31	14.82 $\pm$ 1.30	11.68 $\pm$ 1.58

注:与本组治疗前比较,^a $P<0.05$,与对照组比较,^b $P<0.01$

3 讨论

抑郁症状是慢性肾衰血液透析患者由于长期困扰,昂贵的透析费用,以及沉重的家庭负担等诸多因素所导致的。祖国医学认为此临床证候属于“郁证”,是情感拂郁,气机郁结不畅,引起五脏气机阻滞的一类病证。古代学者提出,郁是由于各种病因所致脏腑功能失调,引起人体气血津液等淤滞不通而郁(瘀)^[4]。还有学者认为“初病气结在经,久则血伤入络”。络病理论认为,络脉是气血运行的通路,络以通为用是络病的治疗原则。通心络是根据络病理

论以益气活血、化痰通络为原则,以大补元气之人参为君药,使气旺血行,佐以虫类药搜络通瘀,使络脉瘀去血行,达到瘀(郁)散正复^[5]。现代中药药理研究发现,人参总皂甙能减轻神经功能障碍;土鳖虫可增加心脏耐缺氧能力;蝉蜕有镇静催眠作用;冰片有改善血脑屏障通透性的作用;赤芍、红花对大鼠脑神经肽的敏感度增加^[6]。本实验结果发现,通心络治疗组在治疗第 2 周,患者的 HAMD 评分降低,第 6 周下降更明显,抑郁症状明显改善,总有效率高,显示出较好的抗抑郁效果,但有关通心络抗抑郁的现代作用机制仍需进一步研究。

本研究表明,通心络治疗血液透析患者抑郁症状具有安全、有效、副作用少等特点,值得临床推广。

参考文献

- 1 Kimmel PL. Psychosocial factors in adult end-stage renal disease patients treated with hemodialysis: correlates and outcomes[J]. Am J Kidney Dis, 2000, 35(4):132-140.
 - 2 毕增琪. 慢性肾功能衰竭. 见:王海鹰,主编. 肾脏病学[M]. 第 3 版. 北京:人民卫生出版社,1996:1385-1389.
 - 3 中华医学会精神科学会. 中国精神障碍分类与诊断标准[M]. 第 3 版. 济南:山东科学技术出版社,2001:87-89.
 - 4 曲森. 抑郁症与中医“郁证”的关系探讨[J]. 北京中医药大学学报,2004, 27(1):11-13.
 - 5 刘京海,莫亚杰. 通心络胶囊对急性脑梗死患者临床与脑血流影响[J]. 疑难病杂志,2005,3(3):144-146.
 - 6 郑虎占,主编. 中药现代研究与应用[M]. 北京:学苑出版社,1998:1987-5108.
- [收稿日期 2008-07-05][本文编辑 宋卓孙 刘京虹]

右大腿内侧肌肉囊虫病 1 例报告

• 病例报告 •

由国胜, 刘 洋, 姜笑天, 赵文辉, 姚凤娟

作者单位:157000, 黑龙江, 牡丹江市北方医院骨科

1 病例介绍 患者,男,35 岁,朝鲜族。因右大腿内侧肿胀,触及包块 20 天,于 2008-06-26 入院,患者既往有食生猪肉、生鱼肉的嗜好。体检:右大腿中段内侧肿胀,可触及一韧性包块,约 3.0 cm $\times$ 2.0 cm 大小,深压痛,活动度差,边界清楚,行走时右大腿内侧有痛感。临床诊断:右大腿内侧肿物。B 超探及实性包块,边界清楚,内部欠均匀。手术将肌肉内肿物完全切除。病理诊断:右大腿肌肉囊虫病,伴慢性炎症及异物巨细胞反应。术后行头、眼部 CT 均未见异常,患者于术后一周出院,并行抗寄生虫治疗。

2 讨论 肌肉囊虫病^[1],一般无明显症状,寄生数量多时,局部有酸痛无力,发胀或麻木感,根据文献并结合本病例,我们认为肌肉囊虫病的诊断难度不大,病理完全可以确诊。本案例患者有生食猪肉、生鱼肉嗜好是发病的主要因素。故应强调一定要注意个人饮食卫生,改变不良饮食习惯,不吃生肉,提倡熟食,如确诊为寄生虫感染,一定要系统的抗寄生虫治疗。

参考文献

- 1 李冬萍,赵德芳,蔡连顺. 医学寄生虫学[M]. 哈尔滨:黑龙江科学技术出版社,1999:3.