

肺癌胸部皮肤转移 1 例

· 病例报告 ·

崔佩朋, 庞鸿垠, 车中玉, 王东立, 李 雷, 姚志新

作者单位: 136000 吉林, 四平市中心医院胸外科

作者简介: 崔佩朋(1965-), 男, 吉林省四平市人, 副主任医师, 研究方向: 普胸外科诊疗。电话: 13843401778, E-mail: cuipp2008@yahoo.cn。

[关键词] 腺癌; 皮肤转移

[中图分类号] R 734.2 [文章编号] 1674-3806(2009)02-0196-01

1 病例介绍

患者, 男, 76 岁, 因胸痛 1 个月入院。曾在当地医院诊断为“带状疱疹”, 经抗病毒、镇痛等治疗, 胸痛无缓解。查体: 右锁骨上可触及一 2.5×2.0 cm 肿大淋巴结, 质地中等, 表面光滑, 活动性差。左胸部可见数个散在直径约 $0.3 \sim 0.5$ cm 暗红色的结节, 结节部压痛明显。实验室检查血、尿常规, 肝功能均正常。肺螺旋 CT 检查示左肺上叶可见一 2.5 cm 的小结节影, 周围有毛刺、分叶征象, 有胸膜凹陷征。取右锁骨上肿大淋巴结及左胸部丘疹病理活检, 诊断为肺腺癌, 右锁骨上淋巴结, 胸壁皮肤毛囊转移(见图 1~3)。予 NP 方案化疗 1 个周期自动出院。



图 1 肺癌胸部皮肤转移表现



图 2 胸 CT 检查示左肺上叶可见一 2.5 cm 的小结节影, 周围有毛刺, 分叶征象, 有胸膜凹陷征




图 3 胸部丘疹病理活检示皮肤真皮内可见癌细胞

2 讨论

肺腺癌早期易出现转移, 但转移到皮肤处较为少见, 肿瘤转移到皮肤在肿瘤患者尸检中占 $0.2\% \sim 9.0\%$ ^[1]。皮肤转移癌可分为炎症型(丹毒样癌)、结节型、硬化型^[2]。且皮肤转移癌常呈多型性表现, 无特异性, 故容易误诊。本病例属于炎症型转移癌, 表现红色结节, 有触痛, 无发热, 外周血白细胞计数无增高。曾多次误诊“带状疱疹”。如肺癌出现皮肤转移, 行局部病理活检快捷、准确。皮肤转移癌发生部位常靠近原发癌, 是由血行转移所致。肺癌细胞可直接进入肺静脉, 通过体循环转移到全身各处。胸部皮肤转移癌主要由肺癌引起。肺癌出现皮肤转移是肺癌晚期的表现, 预后极差, 生存期不超过 1 年^[1]。皮肤转移癌对放疗、化疗、冷冻等治疗疗效均不明显。

参考文献

- 1 靳培英. 皮肤转移癌[J]. 实用肿瘤杂志, 1992, 7(3): 133-135.
- 2 孔令城, 赵保华, 张宜铃. 肺癌皮肤转移的临床病理特征(附 2 例分析)[J]. 上海医学, 1996, 19(2): 77-78.

[收稿日期 2008-11-30][本文编辑 宋卓孙 刘京虹]