

无急性炎性改变。(3)胆总管下端无狭窄,胆管泥沙样结石取净。(4)术前肝功能检查胆红素、转氨酶及淀粉酶升高,术中探查有肝内胆管结石或残石、胆道感染严重、十二指肠乳头严重水肿者需要行胆总管 T 型管引流,以避免围手术期胆道高压致胆汁渗漏。

参考文献

- 1 吴阶平,裘法祖.黄家驷·外科学[M].第6版.北京:人民卫生出版社,2000:1274.
 - 2 秦明放,鲁焕章.内镜和腹腔镜联合治疗复杂性胆石症患者[J].中华消化内镜杂志,1999,16(5):290.
 - 3 胡三元,亓玉忠,张建良,等.腹腔镜胆总管切开纤维胆道镜取石术260例报告[J].山东医药,2001,41(14):9-10.
 - 4 胡三元,亓玉忠,张建良,等.腹腔镜胆总管切开取石 T 管引流术210例报告[J].中国现代手术学杂志,2000,4(4):253-255.
 - 5 王存川,徐以浩,陈均,等.电视腹腔镜胆总管切开探查后胆总管 I 期缝合术[J].中华普通外科杂志,2000,15(8):478.
 - 6 贺为人,马明坤,彭祥玉.腹腔镜胆总管切开纤维胆道镜取石胆总管 I 期缝合60例分析[J].肝胆胰外科杂志,2003,15(1):33.
- [收稿日期 2012-06-12] [本文编辑 刘京虹 吕文娟]

成人视网膜母细胞瘤 1 例

• 病例报告 •

李士敏, 王玉霞

作者单位: 261100 山东 潍坊市寒亭区人民医院眼科

作者简介: 李士敏(1981-),女,大学本科,医学学士,主治医师,研究方向:眼科肿瘤及青光眼的诊治。E-mail: lishimin858@163.com

[关键词] 视网膜母细胞瘤; 成人; 误诊

[中图分类号] R 77 [文章编号] 1674-3806(2012)11-1067-01

doi: 10.3969/j.issn.1674-3806.2012.11.24

1 病例介绍

患者,男,50岁,因右眼视力进行性下降半年伴胀痛1周,于2012-02-06入院。患者曾在当地医院以“视网膜脉络膜炎”给予地塞米松治疗1个月,但效果不佳。眼科检查:左眼视力1.2,右眼无光感。右眼混合性充血,角膜轻度水肿,虹膜密布新生血管。眼部B超示:右眼玻璃体混浊,球内不均匀密度占位性病变。彩色多普勒超声检查病变内见来自视网膜较粗大的动静脉血流信号。眼眶CT提示右眼球内占位性病变,恶性肿瘤可能性大。入院后,于2012-02-10在全麻下行右侧眼球摘除术。术后病理报告为视网膜母细胞瘤,视神经断端未见肿瘤细胞。

2 讨论

视网膜母细胞瘤是一种来源于光感受器前体细胞的恶性肿瘤,90%以上的病例见于5岁前,是儿童最常见的眼内恶性肿瘤^[1]。本病成人罕见,故在成人眼内占位性病变的鉴别诊断中常被忽视,造成漏

诊误诊。视网膜母细胞瘤临床表现复杂,可表现为结膜充血水肿、角膜水肿、虹膜新生血管、玻璃体混浊、眼压升高及斜视等,如此复杂的临床表现给临床诊断带来一定困难^[2]。视网膜母细胞瘤诊断及治疗对患者的生命至关重要,应加强对该病的识别,尤其对成年人患有眼痛、青光眼、视网膜脱离、视网膜肿瘤、葡萄膜炎、玻璃体混浊、虹膜新生血管、眼压升高、斜视等表现,均应考虑该病,并首选B超检查,进一步可结合CT或MRI检查,避免漏诊误诊。

参考文献

- 1 Nork TM, Schwartz TL, Doshi HM, et al. Retinoblastoma cell of origin[J]. Arch Ophthalmol, 1995, 113(6):791-802.
- 2 Odashiro AN, Pereira PR, de Souza Filho JP, et al. Retinoblastoma in an adult: case report and literature review[J]. Can J Ophthalmol, 2005, 40(2):188-191.

[收稿日期 2012-08-03] [本文编辑 宋卓孙 蓝斯琪]