- 2 Carel JC, Lahlou N, Roger M, et al. Precocious puberty and statural growth[J]. Hum Reprod Update, 2004;10(2):135-147.
- 3 Mul D, Versluis-den Bieman HJ, Slijper FM, et al. Psychological assessments before and after treatment of early puberty in adopted children[J]. Acta Paediatr, 2001,90(9):965-971.
- 4 Partsch CJ, Heger S, Sippell WG. Management and outcome of central precocious puberty[J]. Clin Endocrinol(Oxf), 2002,56(2):129-148.
- 5 杜敏联. 性早熟的诊断和治疗进展[J]. 中国实用儿科杂志, 1999,14(7):387-389.
- 6 Badouraki M, Christoforidis A, Economou I, et al. Evaluation of pelvic ultrasonography in the diagnosis and differentiation of various forms of sexual precocity in girls[J]. Ultrasound Obstet Gynecol, 2008,32(6):819-827.
- 7 de Vries L, Horev G, Schwartz M, et al. Ultrasonographic and clinical parameters for early differentiation between precocious puberty and premature thelarche[J]. Eur J Endocrinol, 2006,154(6):891-898.
- 8 Haber HP, Wollmann HA, Ranke MB. Pelvic ultrasonography: early differentiation between isolated premature thelarche and central precocious puberty[J]. Eur J Pediatr, 1995,154(3):182-186.
- 9 King LR, Siegel MJ, Solomon AL. Usefulness of ovarian volume and cysts in female isosexual precocious puberty[J]. J Ultrasound Med, 1993,12(10):577-581.
- 10 Herter LD, Golendziner E, Flores JA, et al. Ovarian and uterine findings in pelvic sonography: comparison between prepubertal girls, girls with isolated thelarche, and girls with central precocious puberty[J]. J Ultrasound Med, 2002,21(11):1237-1246.

[收稿日期 2015-05-11][本文编辑 韦颖]

学术交流

血清 β -羟丁酸测定在糖尿病酮症酸中毒中的临床应用价值

杨秀兰, 朱星成

作者单位: 671000 云南,大理市第一人民医院检验科

作者简介: 杨秀兰(1974-),女,大学本科,医学学士,主管检验师,研究方向:临床化学检验。E-mail:463265295@qq.com

[摘要] 目的 探讨血清 β -羟丁酸测定在糖尿病酮症酸中毒(DKA)中的临床应用价值。方法 选取2013-03~2014-03该院住院糖尿病患者127例,其中糖尿病无酮症酸中毒(NDKA组)105例,DKA组22例;另同期选取健康体检人员(正常对照组)120名。采用酶比色法测定三组血清 β -羟丁酸和血糖浓度水平,分析其在各组间的差异,并应用受试者工作特征曲线(ROC曲线)进行分析。结果 三组 β -羟丁酸、血糖浓度水平比较差异有统计学意义($P < 0.01$),DKA组、NDKA组明显高于正常对照组($P < 0.05$),而DKA组又高于NDKA组($P < 0.05$)。血清 β -羟丁酸诊断DKA最佳临界值为1.97 mmol/L,敏感度为87.8%,特异度为95.3%,曲线下面积(AUC)为0.947。结论 血清 β -羟丁酸检测对DKA有较好的准确性,能早期诊断DKA。

[关键词] 糖尿病酮症酸中毒; β -羟丁酸; 临床应用

[中图分类号] R 587.1 **[文献标识码]** B **[文章编号]** 1674-3806(2016)03-0247-03

doi:10.3969/j.issn.1674-3806.2016.03.20

Clinical application of serum β -hydroxybutyric acid in diagnosis of diabetic ketoacidosis YANG Xiu-lan, ZHU Xing-cheng. Department of Clinical Laboratory, the First People's Hospital of Dali City, Yunnan 671000, China

[Abstract] **Objective** To explore the clinical value of serum β -hydroxybutyric acid in the diagnosis and treatment of diabetic ketoacidosis (DKA). **Methods** The levels of serum β -hydroxybutyric acid and blood glucose were examined in 105 diabetic patients without ketoacidosis, in 22 patients with DKA, and in 120 healthy controls. The relationships between β -hydroxybutyric acid and blood glucose in different groups were analyzed, and the clinical values were analyzed by ROC method. **Results** The sensitivity was 87.8%, specificity was 95.3%, and AUC was 0.947 in condition that the cut-off point was set at 1.97 mmol/L for identifying DKA from diabetic patients. **Conclu-**

sion Serum β -hydroxybutyric acid has high accuracy for diagnosing DKA.

[Key words] Diabetic ketoacidosis(DKA); β -hydroxybutyric acid; Clinical application

中国糖尿病患者数已高达 9 240 万,每年高达 13% 的医疗支出用于治疗糖尿病及其并发症,有效的预防和控制可节约医疗资源^[1,2]。无论 1 型糖尿病,还是 2 型糖尿病患者都可因为疾病、应激等诱发糖尿病酮症酸中毒(diabetic ketoacidosis, DKA),美国糖尿病协会(ADA)声明^[3],糖尿病患者在伴有急性疾病、应激反应、怀孕、或血糖水平持续超过 13.4 mmol/L 时都应该测定血清 β -羟丁酸(最重要的酮体成分)浓度,血酮检测能够量化 β -羟丁酸,是进行 DKA 诊断监测的首选方法。2004 年 ADA 推荐以定量血酮(血 β -羟丁酸)检测替代尿酮检测,推广其在糖尿病家庭自我监测和 DKA 诊治中应用^[4]。血 β -羟丁酸定量检测可以快速、准确地对 DKA 进行诊断,具有较好的实验敏感度和特异度^[5]。因此,本研究探讨 β -羟丁酸在 DKA 诊断中的临床应用价值。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取 2013-03 ~ 2014-03 于我院内分泌科住院的糖尿病患者 127 例,均符合世界卫生组织(WHO)糖尿病诊断标准。其中糖尿病无酮症酸中毒(NDKA 组)105 例,男 55 例,女 50 例;年龄 29 ~ 68(45.5 ± 16.9)岁;空腹血糖 < 15.0 mmol/L,糖化血红蛋白 < 9.0%,临床上无 DKA 的症状。糖尿病酮症酸中毒(DKA 组)22 例,其中男 12 例,女 10 例;年龄 34 ~ 58(40 ± 12.3)岁;尿酮全部为阳性(± ~ +++),血气分析 pH < 7.3,CO₂ 分压降低,有明显的酮症酸中毒临床表现,排除饥饿、酒精性等因素引起的酸中毒。DKA 的诊断均符合 WHO 糖尿病诊断标准。另选取同期来自我院体检中心的健康体检人员 120 名作为正常对照组,其中男 72 名,女 48 名,年龄 24 ~ 65(42 ± 14.6)岁,肝、肾功能、血糖值均在参考范围,心电图、B 超检查无异常,无其他基础疾病。

1.2 检测方法 收集 127 例糖尿病患者及 120 名健康体检人员空腹采静脉血 3 ml,离心血清进行 β -羟丁酸、血糖检测、尿常规及血气分析。采用 AU5811 全自动生化分析仪检测 β -羟丁酸、血糖, β -羟丁酸测定采用酶法,试剂由 DESAY 公司提供,血糖测定采用己糖激酶法,试剂由日本积水化学工业株式会社提供。同时取新鲜尿液进行尿酮体检测,尿酮体定性分析采用亚硝基铁氰化钠法,采用 Bayer CLIN-ITEK 500 尿分析仪及配套试纸,半定量测定尿酮体。

1.3 统计学方法 应用 SPSS17.0 统计软件进行数据处理,计量资料以均数 ± 标准差($\bar{x} \pm s$)表示,组间比较采用 *F* 检验,两两比较采用 SNK-*q* 检验,利用 ROC 曲线以评价 β -羟丁酸的临床诊断价值,Youden 指数为最大,取 cutoff 值,*P* < 0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 三组 β -羟丁酸和血糖检测结果比较 三组 β -羟丁酸、血糖浓度水平差异有统计学意义(*P* < 0.01);DKA 组和 NDKA 组 β -羟丁酸、血糖浓度水平明显高于正常对照组,差异有统计学意义(*P* < 0.05);DKA 组的 β -羟丁酸、血糖浓度水平明显高于 NDKA 组,差异有统计学意义(*P* < 0.05)。见表 1。

表 1 三组 β -羟丁酸和血糖检测结果比较($\bar{x} \pm s$)

组别	例数	β -羟丁酸(mmol/L)	血糖(mmol/L)
正常对照组	120	0.12 ± 0.06	5.0 ± 0.9
NDKA 组	105	0.37 ± 0.20*	11.88 ± 2.9*
DKA 组	22	1.71 ± 1.24* [△]	23.61 ± 10.86 [△] *
<i>F</i>	-	26.41	18.36
<i>P</i>	-	0.000	0.000

注:与正常对照组比较,**P* < 0.05;与 NDKA 组比较,[△]*P* < 0.05

2.2 β -羟丁酸诊断 DKA 的 ROC 曲线、最佳临界值、敏感度和特异度 β -羟丁酸诊断 DKA 的 ROC 曲线见图 1。血清 β -羟丁酸诊断 DKA 的最佳临界值为 1.97 mmol/L,敏感度为 87.8%,特异度为 95.3%,阳性似然值(+LR)为 29.891,阴性似然值(-LR)为 0.72,曲线下面积(AUC)为 0.947,表明 β -羟丁酸对诊断 DKA 有较好的诊断价值。

图 1 β -羟丁酸诊断 DKA 的 ROC 曲线图

3 讨论

3.1 β -羟丁酸是脂肪氧化分解代谢产物之一,来源主要有二个途径,一是长时间饥饿后乙酰乙酸(AcAc)在肝中的降解,二是由高脂饮食后脂肪酸代谢分解产生^[6]。由于糖尿病患者存在胰岛素分泌不足和葡萄糖利用障碍,在感染、应激等诱因下导致脂肪代谢紊乱而产生 β -羟丁酸,累积至一定水平时可导致DKA^[7]。DKA是临床上常见的糖尿病急性并发症,如果诊治不及时有可能威胁患者的生命,在临床上主要依靠尿酮检测判断,尿酮检测主要对乙酰乙酸水平敏感,与丙酮反应较弱,与酮体的主要成分 β -羟丁酸却无反应,故不能很好地反映DKA的严重程度。有报道^[8]称,尿酮体阴性的糖尿病患者 β -羟丁酸水平亦有增高。有研究^[9]表明,与酮体相比,血清 β -羟丁酸水平能更好地反映DKA患者的病情,但血清 β -羟丁酸水平受生理因素影响多,变异性较大。生理情况下,酮症多见于禁食、高脂饮食、长时间剧烈运动、应激等。新生儿和孕妇血清中的酮体也会稍增高。不同人种、年龄、空腹时间、基础代谢率及肝糖骨骼肌的蛋白质和氨基酸代谢等,均会引起血清 β -羟丁酸水平变化。另外病理性酮症不仅仅由糖尿病引起,还可通过皮质醇减少症、生长激素缺乏、乙醇或水杨酸盐摄入过量而中毒及一些罕见的先天性代谢病引起。因此,在发现血酮值增高时,需排除生理因素影响,联合血糖检测,结合临床症状综合判断。

3.2 本研究表明,NDKA组、DKA组及正常对照组 β -羟丁酸、血糖浓度水平差异有统计学意义($P < 0.01$),NDKA组与DKA组明显高于正常对照组($P < 0.05$),而DKA组又高于NDKA组($P < 0.05$)。血清 β -羟丁酸诊断DKA的最佳临界值为1.97 mmol/L,敏感度为87.8%,特异度为95.3%,曲线下面积(AUC)为0.947, β -羟丁酸对诊断DKA有较好的准确性。血清 β -羟丁酸定量检测具有快速、准确、可靠及较

高的敏感度等特点,不仅弥补尿酮体检测的不足,当糖尿病患者发生DKA时,能更全面有效地反映糖尿病患者的病情严重程度,对诊断和监护具有重要意义,为糖尿病尤其是DKA提供早期诊断、病情评估及治疗监测具有重要意义,可成为DKA诊治的主要实验室指标^[10]。

参考文献

- 1 Cheng TO. Diabetes epidemic in China and its economic impact[J]. Int J Cardiol, 2011, 149(1): 1-3.
- 2 Yang W, Lu J, Weng J, et al. Prevalence of diabetes among men and women in China[J]. N Engl J Med, 2010, 362(12): 1090-1101.
- 3 Sack DB, Bruns DE, Goldstein DE, et al. Guidelines and recommendations for laboratory analysis in the diagnosis and management of diabetes mellitus[J]. Clin Chem, 2002, 48(3): 436-472.
- 4 Goldstein DE, Little RR, Lorenz RA, et al. American Diabetes care. Tests of glycemia in diabetes[J]. Diabetes Care, 2004, 27(Suppl 1): s91-s93.
- 5 Arora S, Probst MA, Agy C, et al. Point-of-care beta-hydroxybutyrate testing for assessing diabetic ketoacidosis severity prior to treatment in the emergency department[J]. Diabetes Res Clin Pract, 2011, 96(3): e86-e88.
- 6 Laeger T, Cornelia C, Metge S, et al. Role of beta-hydroxybutyric acid in the central regulation of energy balance[J]. Appetite, 2010, 54(3): 450-455.
- 7 Stojanovic V, Ihles S. Role of beta-hydroxybutyric acid in diabetic ketoacidosis: a review[J]. Can Vet J, 2011, 52(4): 426-430.
- 8 Barano Y. Blood level of ketone bodies and its clinical significance [J]. Nippon Rinsho, 2002, 60(Suppl 8): S420-S432.
- 9 Sheikh-Ali M, Karon BS, Basu A, et al. Can serum beta-hydroxybutyrate be used to diagnose diabetic ketoacidosis? [J]. Diabetes Care, 2008, 31(4): 643-647.
- 10 Umpierrez GE, Watts NB, Phillips LS, et al. Clinical utility of B-hydroxybutyrate determined by reflectance meter in the management of diabetic ketoacidosis[J]. Diabetes Care, 2005, 28(16): 1137-1138.

[收稿日期 2015-06-19][本文编辑 韦所芬]

欢迎订阅 欢迎投稿 欢迎刊登广告

本刊地址:广西南宁市桃源路6号,邮编:530021,电话:(0771)2186013

E-mail: zgclxyzz@163.com

《中国临床新医学》杂志编辑部